

## SERVIZIO SANITARIO REGIONALE **EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico





PROVA SCRITTA
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

## PROVA N. 1

	Secondo la tecnica originale, quale è l'ultima osteotomia ad essere eseguita nell'intervento di osteotomia periacetabolare bernese?
1	Risposta:
	Cosa si intende per impingment tipo 2 sec. Hetsroni?  Risposta:
2	Nisposta.
70.73	
	Quali sono i sintomi dell'impingment ischiofemorale?
3	Risposta:
3	
	Da un punto di vista radiografico come si presenta la Kohler line nel tipo 3a secondo la classificazione di Paprosky delle perdite di sostanza ossea acetabolare?
4	Risposta:
p. The state of	
	Come si modifica il centro di rotazione dell'anca nel tipo 2B secondo la classificazione di Paprosky delle perdite di sostanza ossea acetabolare?
_	Risposta:
5	
30 A	
18.12	

	Secondo la classificazione di Vancouver, come si classifica una frattura periprotesica di anca che interessa la diafisi femorale attorno allo stelo protesico, in cui la componente
	femorale risulta stabile?
6	Risposta:
	Secondo la classificazione di Vancouver, come si classifica una frattura periprotesica di anca che interessa la diafisi femorale attorno allo stelo protesico, in cui la componente femorale risulta mobilizzata ed il bone stock femorale severamente compromesso?
	Risposta:
	Definire i criteri maggiori per infezione periprotesica proposti nell'International Consensus Meeting 2018.
8	Risposta:
-0	
9	Da che cosa è costituito il biofilm?  Risposta:
9	
	Qual è il criterio temporale per definire un'infezione periprotesica tardiva?
10	Risposta:
	Nella protesi totale di ginocchio, qual è il limite di deformità angolare sul piano coronale per il femore per poter eseguire resezione ossea intra-articolare, senza ricorrere ad
11	osteotomia extra-articolare associata? Risposta:
	Fino a che età è consentito il prelievo per la donazione di cartilagine vitale, allotrapianti osteocondrali o menisco secondo le Linee guida correnti approvate dal Centro Nazionale Trapianti?
12	Risposta:

Salla. A M



13	Quali sono le fratture tipo A di omero distale secondo la classificazione AO di Muller?  Risposta:
14	Che cosa si intende per frattura trans-colonnare di gomito?  Risposta:
15	Per quale finalità è proposta la ricerca dell'esterasi intra-articolare?  Risposta:

AH 1/2