


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



**PROVA SCRITTA**  
**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,**  
**PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**  
**DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**  
**DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

**PROVA N. 2**

<b>1</b>	Secondo la tecnica originale, quale è la seconda osteotomia che viene eseguita nell'osteotomia periacetabolare bernese?
	Risposta:
<b>2</b>	Cosa si intende per impingement tipo 3 sec. Hetsroni?
	Risposta:
<b>3</b>	Quali sono i principali tipi di impingement extra-articolari dell'anca?
	Risposta:
<b>4</b>	Da un punto di vista radiografico, che cosa indica il cross-over sign nell'anca?
	Risposta:
<b>5</b>	Secondo Paprosky, come si classifica una severa migrazione superomediale maggiore di 2 cm del cotile?
	Risposta:

*[Handwritten signatures]*

<b>6</b>	Secondo Paprosky, come si classifica una mobilitazione dello stelo protesico con estesa perdita di sostanza ossea metafisaria e diafisaria femorale con osso diafisario intatto maggiore o uguale a 4 cm?
	Risposta:

<b>7</b>	Quali sono i riferimenti ossei a livello femorale che vengono comunemente utilizzati per determinare la corretta rotazione della componente stesa nella protesi di ginocchio?
	Risposta:

<b>8</b>	Secondo la classificazione di Vancouver delle fratture periprotetiche di anca, come vengono definite le fratture francamente distali allo stelo protesico?
	Risposta:

<b>9</b>	Per quale finalità è proposta la ricerca della alpha-difensina 1 sinoviale?
	Risposta:

<b>10</b>	Quale nuovo criterio minore è stato proposto in occasione dell'International Consensus Meeting 2018 per la diagnosi di infezione periprotetica?
	Risposta:

<b>11</b>	Fino a che età è consentito il prelievo per la donazione di tendini e di fascia lata secondo le Linee guida correnti approvate dal Centro Nazionale Trapianti?
	Risposta:

<b>12</b>	Definire i limiti temporali previsti per il prelievo del tessuto muscoloscheletrico secondo le linee guida correnti approvate dal Centro Nazionale Trapianti se il corpo non viene refrigerato.
	Risposta:

S.P.A. S.P.A.



<b>13</b>	Quale nervo misto può essere coinvolto nella genesi della sintomatologia del groin pain nella patologia del canale inguinale (inguinal disruption)?
	Risposta:

<b>14</b>	Nella protesi di ginocchio, quale soluzione va applicata se l'articolazione risulta serrata in estensione?
	Risposta:

<b>15</b>	Quali patologie di interesse ortopedico sono più frequentemente associate alla sindrome di Li-Fraumeni?
	Risposta:

*Handwritten signature*

